

## Tisztelt Partnerünk!

Ez az ismertető egy igen régóta létező és köztudottan jótékony hatású takarmány kiegészítő köré épül, mely nem más, mint a vajsav. A készítmény évekre kiszorult az állattartó telepekről, hiszen rendkívül erős, kellemetlen szaga miatt nem alkalmazta senki, annak ellenére, hogy köztudottan a bélegészség egyik legjobb támogatója. Az **And Nutrition** spanyol cég megoldotta ezt a problémát és megalkotott egy rendkívül innovatív terméket, mely védett formában tartalmazza a vajsav mono-, di- és tri-gliceridjeit. Ezt a takarmány kiegészítőt **Enterohelp**-nek hívják, és a védett vajsavon felül különböző esszenciális olajokat is tartalmaz, mint a fahéj-aldehyd, fokhagyma és hagyma kivonat. A termékről részletesebben a mellékelt prospektusban olvashat, az alábbiakban pedig röviden megismertetünk Önnel 4 alkalmazási lehetőséget, melyek célja a bélegészség megteremtése és megtartása a sertéseknél.

### **I. alkalmazási javaslat: Enterohelp Liquid vajsav egyedüli használata:**

1. lépés: A választás után közvetlenül, 7 napon keresztül, 24 órás (minimum 12 óras) itatással, 300ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.
2. lépés: A prestarter – starter váltásakor, a takarmányváltás előtt 1 nappal elkezdve, 3 napon keresztül, szintén 24 órás (min. 12 óras) itatással, 250ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.
3. lépés: A hízó időszakban, 3-szor hetente (nem egymást követő napokon), 24 órás (min. 12 óras) itatással, 200ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.

### **II. alkalmazási javaslat: Enterohelp Liquid vajsav és Biacton Plus probiotikum kombinált használata:**

1. lépés: - Fialás után közvetlenül a malacoknak 3 napon keresztül **Biacton Plus** terméket, 66 gramm/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.  
- Majd közvetlenül ez után 4 napon át Enterohelp LQ, 24 órás (min. 12 óras) itatással, 250ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.
2. lépés: A prestarter – starter váltásakor, a takarmányváltás előtt 1 nappal elkezdve, 3 napon keresztül, **Biacton Plus** terméket, 66 gramm/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.
3. lépés: A hízó időszakban, 3-szor hetente (nem egymást követő napokon), 24 órás (min. 12 óras) itatással, 200ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.

### **III. alkalmazási javaslat: Enterohelp Liquid vajsav és And Cid Water FLP ivóvíz savanyító kombinált használata:**

1. lépés: Választás után folyamatosan savanyítani az ivóvizet **And Cid Water FLP**-vel, cél a 4,5-5 közötti PH elérése és fenntartása.

2. lépés: A prestarter – starter váltásakor, a takarmányváltás előtt 1 nappal elkezdve, 3 napon keresztül **Enterohelp LQ**, szintén 24 órás (min. 12 óras) itatással, 250 ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.
3. lépés: A hízó szakasz indulásánál 5 napig folyamatosan, majd utána 3-szor hetente (nem egymást követő napokon), 24 órán (min. 12 órán) keresztül, 200ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni.

#### **IV. alkalmazási javaslat: Enterohelp Liquid vajsav + Biacton Plus probiotikum és And Cid Water FLP ivóvíz savanyító kombinált használata:**

1. lépés: Választás után 3 napig a **Biacton Plus** terméket 66 gramm/m<sup>3</sup> víz adagban itatni, és ezzel párhuzamosan elkezdni az **And Cid Water FLP**-vel a savanyítást folyamatosan, hogy az ivóvíz PH értéke 4,5-5 között legyen.
2. lépés: A prestarter – starter váltásakor, a takarmányváltás előtt 1 nappal elkezdve, 3 napon keresztül **Enterohelp LQ**, szintén 24 órás (min. 12 óras) itatással, 250ml/m<sup>3</sup> víz adagolással itatni + folyamatos savanyítás az **And Cid Water FLP** termékkel.

Az **Enterohelp** és **Biacton** termékeink az itatható formátumon kívül léteznek takarmányba keverhető változatban is, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb alkalmazási módot választhassa.

A mellékletben található prospektusok részletesen bemutatják fent megjelölt termékeinket, kérem tekintse meg és ha bármilyen kérdése lenne keressen, örömmel állok rendelkezésére!