

# CSIBE ZSELÉ

**A kimagasló broiler teljesítmények már az első napon kezdődnek.**

## **Napos csirkék kiszáradásának megelőzése.**

**Kritikus pontok:** a kikelés és az első takarmány/ivóvíz felvétele közti idő (36-48 óra). A környezeti hőmérséklet és páratartalom változás miatt, testtömeg és vízvesztés. Vékonybél visszamaradt fejlődése, bélbolyhok károsodása.

**Előnyök:** könnyű elkeverni  
könnyen fogyasztható  
azonnali táplálás: tápanyag és víz egyszerre

**Használat:** Keverjük az 500g mennyiséget 10 liter tiszta ivóvízbe. Jól oszlassuk el és hagyjuk 20 percig pihenni. Használjuk fel a gél 6 órán belül. Ez a mennyiség 10.000 naposcsibe számára elegendő, de függ attól is, hogy milyen gél állagot preferál a felhasználó. Használható keltető tálcán, napos szállító dobozon, csibepapíron fogadásakor.



### **Partnervisszajelzések:**

- 1.) A termék használata előtti 2%-os kezdeti elhullás lecsökkent néhány darabra.**
- 2.) Amikor nem használtak csibezselét a fogadáshoz, a kezdeti elhullás több mint 2%-ra emelkedett.**
- 3.) A csibezselé használata nélkül a brojlerek 5 hetes súlya kb. 2,9 kg. Csibezselével mindez az erősebb startnak köszönhetően 3,0-3,2 kg körül mozgott.**

**Adag broiler:** 1g / napos csibe

**Adag pulyka:** 2g / pulyka pipe

### **Összetétel:**

Cereáliák, cereália melléktermékek, növényi fehérjék, gél képzők, melasz, kalcium karbonát, vitaminok, nyomelemek, színező (E14(ii)) enterococcus faecium (E1708).

Fehérje:9% Olaj:1.5% Rost:7% Hamu:22%

### **Figyelmeztetés!**

- Etetés csak vízzel keverve!
- Az előírt mennyiségű vizet adjuk hozzá!
- Száraz, hűvös helyen tároljuk!

Származási ország: Egyesült Királyság

Magyarországon Forgalmazza: Decart Pannonia Kft. +36-23/333-734

Vitamac Ltd, United Kingdom info@vitamac.co.uk

1-467-3400 www.decartpannonia.hu α szám: HU 20 2 0025

Kiszerezés: 500 g