

Decart Brojler itatási program

életnap	kezelés	Mivel?	liter/m3	takarmány	megjegyzés
1	tejsavbaktérium	Biacton plus		indító morzs.	gyógyszerrel fogadás, vagy/ tejsavbaktérium
2	tejsavbaktérium	Biacton plus		indító morzs.	gyógyszerrel fogadás, vagy/ tejsavbaktérium
3	tejsavbaktérium	Biacton plus		indító morzs.	gyógyszerrel fogadás, vagy/ tejsavbaktérium
4	D3+Ca	D3+Ca + Biacton p	0,3	indító morzs.	csontosodás segítése + tejsav bakt.
5	D3+Ca	D3+Ca + Biacton p	0,3	indító morzs.	csontosodás segítése + tejsav bakt.
6	D3+Ca	D3+Ca + Biacton p	0,3	indító morzs.	csontosodás segítése + tejsav bakt.
7	D3+Ca	D3+Ca + Biacton p	0,3	indító gr.	csontosodás segítése + tejsav bakt.
8	Itatórendszer tisztító	Hydrocare	0,1	indító gr.	24 órán keresztül
9	Itatórendszer tisztító	Hydrocare	0,1	indító gr.	12 órán keresztül
10	IB vakcina			indító gr.	
11				indító gr.	
12	Se+E + Biacton plus	Se+E	0,1	indító gr.	elhullás csökkentés + tejsav bakt
13	tejsavbaktérium	Biacton plus		indító gr.	gyógyszerezés, vagy/ tejsavbaktérium
14	tejsavbaktérium	Biacton plus		indító gr.	gyógyszerezés, vagy/ tejsavbaktérium
15				indító gr.	
16	Gumborro vakcina			indító gr.	
17				nevelő gr.	
18	hozamfokozó	NUTRIMIX	0,5	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
19	Itatórendszer tisztító	Hydrocare	0,1	nevelő gr.	24 órán keresztül
20	Itatórendszer tisztító	Hydrocare	0,1	nevelő gr.	12 órán keresztül
21	Pestis vakcina			nevelő gr.	
22				nevelő gr.	
23	hozamfokozó	NUTRIMIX	0,5	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
24	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
25	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
26	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
27	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
28	Se+E v. hozamfokozó	Se+E	0,1	nevelő gr.	elhullás csökkentés
29	Váz és csont erősítő	Calferol	1,5	nevelő gr.	vázerősítés
30	Váz és csont erősítő	Calferol	1,5	nevelő gr.	vázerősítés
31	hozamfokozó	NUTRIMIX	0,5	nevelő gr.	savanyít és kiegészít

32	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
33	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	nevelő gr.	savanyít és kiegészít
34	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
35	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
36	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
37	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
38	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
39	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
40	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
41	hozamfokozó	NUTRIMIX	1,0	befejező gr.	savanyít és kiegészít
42	száll. stressz csökk.	Osmosan	1,0	befejező gr.	utolsó 12 órában adjuk szállítás előtt

Megj.: A gyógyszererezések idejének a lehetősége ki van hagyva a javaslatban.....

A Biactob plus adagja 34 g/ m3 ivóvíz. Törzsoldatból dolgozzunk, max. 2 napi bekeveréssel.

Fontos, hogy az első hétre ütemezett D3+ Ca vitaminozás legkésőbb 8 napos korig befejeződjön. Ideje 3-4 nap

Cobb esetén a hozamfokozás két hetes kor után javasolt az antibiotikumos kezelés a combcsontfej nekrosis miatt.

Az intenzív brojler sor viatmin tartalma a hizlalás során elegendő, nem szükséges D3-on kívül más vitamin

A takarmány energia többlete teszi lehetővé a folyékony szója (Nutrimix) maradéktalan hasznosulását

Az különböző itatások váltása között teljen el min. 2 óra, hogy a rendszerben a kezelő anyagok ne "találkozzanak"

A Se+E Vitamin használata kell, ha a "hanyagdt vágodott" 50%-ot meghalad a napi elhullásból, nem automatikusan!

A Hydrocare az itatórendszert tisztítja, csökkenti az eldugulás és a csöpögés veszélyét

A NUTRIMIX megnöveli a víz-, és a tak. felvételt, javítja az emésztést, szárítja az almot, csökkenti az ammóniát

Vakcinázás előtt 12 órával, alatta és után egy napig ne adjunk semmilyen kiegészítőt!

Gyógyszerezés esetén semmilyen más anyagot ne adagoljunk a rendszerbe

Gyógyszerezés után 2-3 napi tejsav baktérium és/vagy vajsav adagolása (Biacton, Andbut, Laktiferm, Gasrtoferm)

A Calferolt szükség esetén bármikor bevethetjük, ha az allomány lassabban mozog, vagy leül, adagja, 1,5 liter/m3

Az Osmosan itatás csak, ha a vágóhídi szállítási táv több, mint fél óra, vagy az ottani várakoztatás, több, mint 2 ó